

## 2.4 常见的离散型随机变量的分布

### (1) 0-1 分布

$X = x_k$	1	0	$0 < p < 1$
$P_k$	$p$	$1 - p$	

应用场合

凡是随机试验只有两个可能的结果，

如产品是否合格、人口性别统计、

系统是否正常、电力消耗是否超负荷等等。

注 其分布律可写成

$$P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}, \quad k = 0, 1$$

服从(0-1)分布的试验叫做贝努利试验。

随机试验有两个可能的结果： $A, \bar{A}$

设  $P(A) = p, 0 < p < 1$

将此试验独立的重复  $n$  次

称为  $n$  重Bernoulli 试验概型：

$n$  重Bernoulli 试验概型**感兴趣的问题**为：  
在  $n$  次试验中事件  $A$  出现  $k$  次的概率，记为

$$P_n(k)$$

## (2) **二项分布** $B(n, p)$

背景： $n$  重Bernoulli 试验中，事件 $A$  在  $n$  次试验中发生的次数 ——  $X$  是一离散型随机变量

若  $P(A) = p$ ，则

$(X = k)$  即事件 $A$ 在 $n$ 次试验中发生了 $k$ 次  
这 $k$ 次可能是 $n$ 次试验中任意的某个 $k$ 次，  
共有  $C_n^k$  种情况

对于某个指定的 $k$ 次，其余 $n-k$ 次 $A$ 没有发生，  
概率为  $p^k (1-p)^{n-k}$

$$P_n(k) = P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

称  $X$  服从**参数为  $n, p$  的二项分布**，记作

$$X \sim B(n, p)$$

上述定义满足概率的基本性质，即：

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \geq 0$$


$$\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = [p + (1-p)]^n = 1$$

**0-1 分布是  $n = 1$  的二项分布**

## 二项分布的取值情况 设 $X \sim B(8, \frac{1}{3})$

$$P_8(k) = P(X = k) = C_8^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{8-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 8$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
.039	.156	.273	.273	.179	.068	.017	.0024	.0000




由图表可见, 当  $k = 2$  或  $3$  时, 分布取得最大值

$$P_8(2) = P_8(3) = 0.273$$

此时的  $k$  称为最可能成功次数

设  $X \sim B(20, 0.2)$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ~ 20
.01	.06	.14	.21	.22	.18	.11	.06	.02	.01	.002	< .001



## 二项分布中最可能出现次数的定义与推导

若  $P(X = k) \geq P(X = j)$ ,  $j = X$  可取的一切值  
则称  $k$  为最可能出现的次数

$$\text{记 } p_k = P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{p_{k-1}}{p_k} &= \frac{(1-p)k}{p(n-k+1)} \leq 1 \\ \frac{p_k}{p_{k+1}} &= \frac{(1-p)(k+1)}{p(n-k)} \geq 1 \end{aligned} \right\}$$

$$\longrightarrow (n+1)p - 1 \leq k \leq (n+1)p$$

◆ 当  $(n+1)p = \text{整数}$  时，在  $k = [(n+1)p]$  与  $[(n+1)p] - 1$  处的概率取得最大值

当  $(n+1)p \neq \text{整数}$  时，在  $k = [(n+1)p]$  处的概率取得最大值

**例1** 独立射击5000次，每次的命中率为0.001，  
求 (1) 最可能命中次数及相应的概率；  
(2) 命中次数不少于2 次的概率。

**解** (1)  $k = [(n + 1)p] = [(5000 + 1)0.001] = 5$

$$P_{5000}(5) = C_{5000}^5 (0.001)^5 (0.999)^{4995} \approx 0.1756$$

(2) 令 $X$ 表示命中次数，则  $X \sim B(5000, 0.001)$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^1 C_{5000}^k (0.001)^k (0.999)^{5000-k}$$

$$= 0.9574$$

**问题** 如何计算  $P(X \geq 2500)$  ?

若  $X \sim B(n, p)$ , 则当  $n$  较大,  $p$  较小, 而  $np = \lambda$  适中, 则可以用近似公式

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证 记  $np = \lambda$  则  $p = \frac{\lambda}{n}$  那么有

$$\begin{aligned} & C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \left\{ \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \right\} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \end{aligned}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \left\{ \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \right\} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n$$

当  $n \rightarrow \infty$

$$\left\{ \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \right\} \rightarrow 1$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-\frac{n}{\lambda} \cdot (-\lambda)} \rightarrow e^{-\lambda}$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

称为Poisson定理

类似地，设一批产品中有 $M$ 件正品， $N$ 件次品。从中任意取 $n$ 件，则恰好取到 $k$ 个次品的概率为

$$\frac{C_N^k C_M^{n-k}}{C_{M+N}^n}$$

当  $M + N \rightarrow \infty, \frac{N}{M + N} \rightarrow p$  时，

对每个  $n$  有  $\frac{C_N^k C_M^{n-k}}{C_{M+N}^n} \rightarrow C_{M+N}^k p^k (1-p)^{n-k}$

## 结论

超几何分布的极限分布是二项分布

二项分布的极限分布是 Poisson 分布

注：

$$\begin{aligned} \frac{C_N^k C_M^{n-k}}{C_{M+N}^n} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{N!M!(M+N-n)!}{(M+N)!(N-k)!(M-n+k)!} \\ &= C_n^k \left( \frac{N}{M+N} \right)^k \left( \frac{M}{M+N} \right)^{n-k} \\ &\quad \cdot \frac{N \cdot (N-1) \cdots (N-k+1)}{N^k} \cdot \frac{M \cdot (M-1) \cdots (M-n+k+1)}{M^{n-k}} \\ &\quad \cdot \frac{(N+M) \cdot (N+M-1) \cdots (N+M-n+1)}{(M+N)^n} \end{aligned}$$

## 利用Poisson定理再求例1 (2)

**解** 令 $X$ 表示命中次数，则 $X \sim B(5000, 0.001)$

令 $\lambda = np = 5$

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - \sum_{k=0}^1 C_{5000}^k (0.001)^k (0.999)^{5000-k} \\ &\approx 1 - \sum_{k=0}^1 e^{-5} \frac{5^k}{k!} \\ &= 1 - e^{-5} \left( \frac{5^0}{0!} + \frac{5^1}{1!} \right) = 0.9596 \end{aligned}$$

此结果也可直接查 P.357 附表1 Poisson 分布表得到，它与用二项分布算得的结果0.9574仅相差千分之二点二。

**例2** 某厂产品不合格率为0.03，现将产品装箱，若要以不小于90%的概率保证每箱中至少有100个合格品，则每箱至少应装多少个产品？

**解** 设每箱至少应装 $100+n$ 个，每箱的不合格品个数为 $X$ ，则 $X \sim B(100+n, 0.03)$

由题意 
$$P(X \leq n) = \sum_{k=0}^n P_{100+n}(k) \geq 0.9$$

$$\lambda = (100+n)0.03 = 3 + 0.03n \approx 3 \quad \text{取} \lambda = 3$$

应用Poisson定理

$$\sum_{k=0}^n P_{100+n}(k) \approx \sum_{k=0}^n \frac{3^k}{k!} e^{-3} = 1 - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{3^k}{k!} e^{-3} \geq 0.9$$

→  $\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{3^k}{k!} e^{-3} \leq 0.1$  查Poisson分布表 $\lambda=3$ 一栏

得  $n + 1 = 6$ ,  $n = 5$

所以每箱至少应装105个产品,才能符合要求.

在实际计算中，当  $n \geq 20, p \leq 0.05$  时，可用上述公式近似计算；而当  $n \geq 100, np \geq 10$  时，精度更好

$k$	按二项分布				按Poisson 公式
	$n=10$ $p=0.1$	$n=20$ $p=0.05$	$n=40$ $p=0.025$	$n=100$ $p=0.01$	$\lambda=np=1$
0	0.349	0.358	0.369	0.366	0.368
1	0.305	0.377	0.372	0.370	0.368
2	0.194	0.189	0.186	0.185	0.184
3	0.057	0.060	0.060	0.061	0.061
4	0.011	0.013	0.014	0.015	0.015

**例3** 设有同类型设备90台，每台工作相互独立，每台设备发生故障的概率都是 0.01. 在通常情况下，一台设备发生故障可由一个人独立维修，每人同时也只能维修一台设备.

- (1) 问至少要配备多少维修工人，才能保证当设备发生故障时不能及时维修的概率小于0.01?
- (2) 问3个人共同负责90台还是3个人各自独立负责30台设备发生故障不能及时维修的概率低？

**解** (1) 设需要配备  $N$  个维修工人, 设  $X$  为90 台设备中发生故障的台数, 则  $X \sim B(90, 0.01)$

$$P(X > N) = \sum_{k=N+1}^{90} C_{90}^k (0.01)^k (0.99)^{N-k}$$

令  $\lambda = 90 \times 0.01 = 0.9$

则 
$$P(X > N) \approx \sum_{k=N+1}^{90} e^{-0.9} \frac{0.9^k}{k!}$$
$$= \sum_{k=N+1}^{\infty} e^{-0.9} \frac{0.9^k}{k!} - \sum_{k=91}^{\infty} e^{-0.9} \frac{0.9^k}{k!}$$
$$\approx \sum_{k=N+1}^{\infty} e^{-0.9} \frac{0.9^k}{k!} < 0.01$$

查附表2得  $N = 4$

(2) 三个人共同负责90台设备发生故障不能及时维修的概率为

$$\begin{aligned} P(X > 3) &\approx \sum_{k=4}^{90} e^{-0.9} \frac{0.9^k}{k!} \\ &= \sum_{k=4}^{\infty} e^{-0.9} \frac{0.9^k}{k!} - \sum_{k=91}^{\infty} e^{-0.9} \frac{0.9^k}{k!} \\ &\approx \sum_{k=4}^{\infty} e^{-0.9} \frac{0.9^k}{k!} \\ &= 0.013459 \end{aligned}$$

设30台设备中发生故障的台数为  $Y \sim B(30, 0.01)$

设每个人独立负责30台设备，第  $i$  个人负责的30台设备发生故障不能及时维修为事件  $A_i$

$$\begin{aligned} \text{则 } P(A_i) &= P(Y \geq 2) \approx \sum_{k=2}^{\infty} e^{-0.3} \frac{0.3^k}{k!} \\ &= 0.0369 \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

三个人各独立负责30台设备发生故障不能及时维修为事件  $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= 1 - \prod_{i=1}^3 P(\bar{A}_i) \\ &= 1 - (1 - 0.0369)^3 \approx 0.1067 > 0.013459 \end{aligned}$$

**故 三个人共同负责90 台设备比各自负责好！**

在Poisson 定理中，

$$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} > 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$= e^{-\lambda} \left( 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots \right)$$

$$= e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

由此产生了一种离散型随机变量的概率分布  
— Poisson 分布

### (3) **Poisson 分布** $\pi(\lambda)$

若  $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$

其中  $\lambda > 0$  是常数, 则称  $X$  服从**参数为  $\lambda$**   
**的Poisson 分布**, 记作  $\pi(\lambda)$

#### 应用场合

在一定时间间隔内:

电话总机接到的电话次数;

一匹布上的疵点个数;

大卖场的顾客数;

市级医院急诊病人数；  
一个容器中的细菌数；  
某一地区发生的交通事故的次数  
放射性物质发出的粒子数；  
一本书中每页印刷错误的个数；  
等等

都可以看作是源源不断出现的随机质点流，  
在长为  $t$  的时间内出现的质点数  $X_t \sim \pi(\lambda t)$

**例4** 设一只昆虫所生虫卵数为随机变量  $X \sim \pi(\lambda)$ , 每个虫卵发育成幼虫的概率为  $p$ . 设各个虫卵是否能发育成幼虫是相互独立的. 求一只昆虫所生的虫卵发育成的幼虫数  $Y$  的概率分布.

**解** 昆虫  $\longrightarrow$   $X$  个虫卵  $\longrightarrow$   $Y$  个幼虫

$$\text{已知 } P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$P(Y = m | X = k) = C_k^m p^m (1-p)^{k-m},$$

$$m = 0, 1, 2, \dots, k$$

$$(Y = m) \subset \bigcup_{k=m}^{\infty} (X = k), \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$(X = k) \cap (X = l) = \emptyset, \quad k \neq l$$

由全概率公式

$$\begin{aligned} P(Y = m) &= \sum_{k=m}^{\infty} P(X = k)P(Y = m|X = k) \\ &= \sum_{k=m}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} C_k^m p^m (1-p)^{k-m} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^m}{m!} \sum_{k=m}^{\infty} \frac{\lambda^{k-m}}{(k-m)!} (1-p)^{k-m} \\ &\stackrel{\text{令 } k-m=s}{=} e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^m}{m!} \sum_{s=0}^{\infty} \frac{\lambda^s}{s!} (1-p)^s \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{\lambda(1-p)} = e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!} \end{aligned}$$

故  $Y \sim \pi(\lambda p)$

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

# 这只昆虫有后代的概率

$$\begin{aligned} & p \left\{ \bigcup_{m=1}^{\infty} (Y = m) \right\} \\ &= 1 - p(Y = 0) \\ &= 1 - e^{-\lambda p} \end{aligned}$$